

# 令和6年度 定期予防接種のしおり

子どもの定期予防接種は、保護者が受けさせるように努めなければならない予防接種です。冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読み、医師から接種に関して詳しい説明を受け、疾病や予防接種の内容を理解したうえで、体調の良い時に接種を受けましょう。

## ☆定期予防接種実施医療機関について

定期予防接種実施医療機関のリストは、市ホームページで公開しているほか、保健所感染症対策課、保健所清水支所、各保健福祉センターで配布しています。



## ☆予防接種を受ける際の持ち物…**予防接種シール**、**母子健康手帳**

- 母子健康手帳と予防接種シールは、予防接種の履歴を確認するとともに、接種の記録を残すことで予防接種の打ち漏れや重複を防止するために大切なものです。**接種の際には必ずお持ちください。**
- 日本脳炎の特例対象者（※）、ヒトパピローマウイルス、不活化ポリオはシールが無くても接種できます。（※平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、20歳の誕生日の前日までの方）
- 予防接種シールを紛失したり、市外から転入した場合は、予防接種シール交付の手続きが必要です。電子申請のほか、来庁・郵送申請も受け付けております。申請には母子健康手帳が必要です。



## ☆接種の間隔

- 注射生ワクチン（MR、BCG、水痘等）後に注射生ワクチンを受ける場合は、**中27日以上**の間隔を空けてください。  
※ 同じワクチン同士の間隔については、上記の間隔を守った上で裏面に記載の各ワクチン毎の適正な間隔を空けてください。

## ☆接種当日の注意

- 接種当日は体温を測り（医療機関でも再度体温を測ります。）、お出かけください。
- 16歳未満の方の予防接種は、保護者の同伴が原則です（ただし、被接種者が13歳以上で接種することの同意を予診票の保護者自署欄で確認できた場合を除く。）。保護者が同伴できないときは、保護者の委任状を持った親族など（祖父母等）が同伴することも可能です。委任状の様式は市ホームページからダウンロードできるほか、本紙下部記載の各窓口に備置してあります。

## ☆接種後の注意

- 接種当日は激しい運動をさけてください。また、接種部位を清潔に保ってください。
- 接種後の発熱、接種部の発赤、腫れなどで心配なときは、医師の診察を受けましょう。
- BCG接種後、数日以内に著しい腫れ、発赤、しこり等が起きた場合、極めて稀ですがコッホ現象が疑われます。コッホ現象自体は心配ありませんが、結核に感染していることが疑われますので、早目に接種医に相談してください。

## ☆予防接種を受けられない場合（予防接種不相当者）

- 明らかに発熱（37.5℃以上）している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな者
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

## ☆静岡市外で定期予防接種を受けたい場合（事前申請が必要です）

市外接種の事前申請は、電子申請のほか、来庁・郵送申請も受け付けております。申請には母子健康手帳が必要です。



### 相談・問い合わせ

葵区	静岡市保健所感染症対策課	☎249-3173	
	城東保健福祉センター	☎249-3180	東部保健福祉センター ☎261-3311
	北部保健福祉センター	☎271-5131	藁科保健福祉センター ☎277-6712
駿河区	長田保健福祉センター	☎259-5112	大里保健福祉センター ☎288-1111
	南部保健福祉センター	☎285-8111	
清水区	清水保健福祉センター	☎348-7711	蒲原保健福祉センター ☎385-5670
	清水保健福祉センター由比分館	☎376-0533	保健所清水支所 ☎354-2153

## 【定期予防接種一覧】

★標準的な接種年齢で接種することをお勧めしますが、被接種者の健康状態等により、やむを得ず接種できなかった場合には、接種対象年齢の期間内に接種してください。 **なお、接種対象年齢ではない年齢での接種は有料（任意）になります。**

ワクチン		標準接種年齢		接種対象年齢	間隔
四種混合 または 五種混合(注1)	1期 初回	1回目	生後2か月～1歳未満	生後2か月～7歳6か月未満	20日以上 (標準的には20日～56日)
		2回目			
3回目					
	追加		初回終了後1年～1年半	7歳6か月未満	1期初回終了後6か月以上
ヒブ (注1)(注2)	初回	1回目	生後2か月～7か月未満	生後2か月～1歳未満	27日以上 (標準的には27日～56日)
		2回目			
3回目					
	追加		初回終了後7か月～1年1か月	5歳未満	初回終了後7か月以上
小児用肺炎球菌 (注2)	初回	1回目	生後2か月～1歳未満	生後2か月～2歳未満	27日以上
		2回目			
3回目					
	追加		1歳～1歳3か月未満	1歳～5歳未満	初回終了後60日以上
B型肝炎	1回目		生後2か月	1歳未満	1回目終了後27日以上 1回目終了後139日以上
	2回目				
	3回目				
ロタウイルス	ロタリックス	1回目	生後2か月～14週6日	生後6週0日～24週0日(注3)	27日以上 ※生後14週6日を過ぎてから初回接種を開始することは推奨されていません。
		2回目			
	ロタテック	1回目	生後2か月～14週6日	生後6週0日～32週0日(注3)	
		2回目			
	3回目				
BCG(結核)			生後5か月～8か月未満	1歳未満	
水痘(水ぼうそう)	1回目		1歳～1歳3か月未満	1歳～3歳未満	3か月以上
	2回目		1回目終了後6か月～1年		
麻しん 風しん (MR)	1期	1回目	1歳～2歳未満	1歳～2歳未満	
	2期	2回目	小学校就学前の1年間	小学校就学前の1年間	
	市独自措置		1回目未接種の2歳～高校3年生相当 2回目未接種の小学1年生～高校3年生相当	(注4) (注4)	
日本脳炎	1期初回	1回目	3歳	生後6か月～7歳6か月未満(注5)	6日以上 (標準的には6日～28日)
		2回目			
	1期追加		4歳	7歳6か月未満(注5)	1期初回終了後6か月以上 (標準的にはおおむね1年)
	2期		9歳	9歳～13歳未満(注5)	
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期		11歳	11歳～13歳未満	
【女子のみ】 ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防)	1回目		中学1年生	小学6年生～高校1年生相当 (注6)	(注7)
2回目					
3回目(注7)					

注1) 五種混合、または四種混合とヒブの組み合わせ接種を受けていただきます。五種混合を受けた方は、ヒブの接種は不要です。

注2) 標準的な接種回数は4回ですが、接種開始時期やその後の接種間隔によって接種回数異なります。

注3) 「生後6週0日」とは、「誕生日の6週間後にある、誕生日と同じ曜日の日」です。数え方は、誕生日の翌日を1日として数えます。

注4) 麻しん・風しんワクチン1回目または2回目の未接種分について、静岡市の負担で接種できます。(静岡市の制度)

注5) 特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方)は20歳の誕生日の前日までの間、接種できます。

注6) 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子で、接種の機会を逃した方は令和7年3月31日までの間、時限的な措置の対象者として接種できます。

注7) 接種するワクチン、年齢によって接種間隔、回数が異なります。接種スケジュールについては医師にご相談ください。

※「高校3年生相当」とは、「18歳を迎える誕生日が属する年度の初日から末日までの間にある者」をいいます。同様に、「高校1年生相当」とは、「16歳を迎える誕生日が属する年度の初日から末日までの間にある者」です。

※上記は令和6年4月現在の情報です。最新の情報は保健所感染症対策課までお問い合わせください。

## ☆市ホームページについて

市ホームページには、最新の予防接種制度や医療機関リストのほか、長期にわたり療養を必要として予防接種の機会を逃してしまった場合や、万一の健康被害に関する情報等も掲載しています。是非ご覧ください。

